

2021 - 2022절기

어린이 인플루엔자 예방접종 안내문



우리 아이들의 건강을 예방접종으로 지켜주세요!

9월 14일부터 가까운 동네 의료기관에서 인플루엔자 예방접종을 할 수 있습니다.

• 어린이 인플루엔자 예방접종 지원사업 •

- **지원대상** 생후 6개월 ~ 만 13세 어린이 (2008.1.1. ~ 2021.8.31. 출생아)
- **접종기관** 지정의료기관 및 보건소
※ 예방접종도우미 누리집 또는 앱에서 확인가능 (보건소는 방문 전 확인필수)
- **지원기간**

2회 접종대상자	2021.9.14.(화) ~ 2022.4.30.(토)
1회 접종대상자	2021.10.14.(목) ~ 2022.2.28.(월)
- **지원내용** 인플루엔자 4가 예방접종 1회
※ 단, 생후 6개월 ~ 만 9세 미만 소아 중 다음 대상자는 2회 접종 지원되니, 접종 전 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종이력을 모르는 경우
- 2021-2022절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우

이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- ✓ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요합니다.
- ✓ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

예방접종 도우미 바로가기



안드로이드폰용 QR코드



아이폰용 QR코드



예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ✓ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- ✓ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ✓ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

● 예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



1
보호자와
대상자 모두
반드시 마스크 착용



2
손소독 등
개인위생 수칙
준수



3
대상자, 보호자는
코로나19 증상이 있을 시
내원 전 알리기



4
접종 후 의료기관에서
15~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

인플루엔자 예방접종 후 이상반응

● 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ✓ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ✓ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

● 예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- ✓ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ✓ 씻지 않은 손으로 코, 눈, 입 등을 만지지 않기
- ✓ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- ✓ 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- ✓ 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교 자제 하기
- ✓ 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료 받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.